

**Tableau 3. Facteurs favorisant d'un évènement thromboembolique veineux à prendre en compte dans l'évaluation du risque de récurrence**

<i><b>Facteurs provoquants</b></i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Chirurgie avec anesthésie générale d'au moins 30 min dans les 1-3 mois qui précèdent</li><li>• Alitement strict d'au moins 3 jours dans un contexte médical aigu dans les 1-3 mois qui précèdent</li><li>• Fracture ou traumatisme d'un membre inférieur dans les 1 à 3 mois qui précèdent</li></ul>
<i><b>Facteurs de risque élevé</b></i>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Grossesse (dès le 1<sup>er</sup> trimestre) et les 6-12 semaines du post-partum</li><li>- Contraception œstroprogestative et traitement hormonal substitutif de la ménopause (surtout si introduction &lt;1 an)</li><li>- Syndrome des anticorps antiphospholipides</li><li>- Déficit en antithrombine</li><li>- Déficit en protéine C</li><li>- Cancer</li><li>- Thrombose sur cathéter veineux</li></ul>
<i><b>Facteurs de risque modéré ou faible</b></i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sexe masculin</li><li>• Obésité</li><li>• Antécédent familial au 1<sup>er</sup> degré d'évènement thromboembolique veineux (surtout si jeune âge, évènement non provoqué et plusieurs apparentés au 1<sup>er</sup> degré concernés)</li><li>• Trajet prolongé en avion</li><li>• Syndrome post-thrombotique</li></ul>