

**Tableau 5. Durée du traitement anticoagulant curatif**

Embolie pulmonaire ou thrombose veineuse profonde proximale <b>provoquée</b>	<b>3 mois</b>
Thrombose veineuse profonde distale <b>provoquée</b>	<b>6 semaines</b>
1 <sup>ère</sup> embolie pulmonaire ou thrombose veineuse profonde proximale <b>non provoquée</b>	<b>6 mois</b> , puis selon risque de récurrence soit prolongation pour durée non limitée, soit apixaban 2,5 mg x2/j pour durée non limitée, soit arrêt
1 <sup>ère</sup> thrombose veineuse profonde distale <b>non provoquée</b>	<b>3 mois</b>
A partir de la 2 <sup>ème</sup> embolie pulmonaire ou thrombose veineuse profonde proximale <b>non provoquée</b>	<b>durée non limitée</b>
A partir de la 2 <sup>ème</sup> thrombose veineuse profonde distale <b>non provoquée</b>	<b>3 mois</b> pour chaque épisode
Embolie pulmonaire ou thrombose veineuse profonde <b>au cours de la grossesse ou du post-partum</b>	<b>toute la grossesse et les 6 semaines du post-partum avec une durée minimale de traitement de 3 mois</b>
Embolie pulmonaire ou thrombose veineuse profonde <b>sous œstrogènes</b>	à considérer comme <b>non provoqué</b> mais plutôt durée limitée
Embolie pulmonaire ou thrombose veineuse profonde <b>au cours d'un cancer</b>	<b>6 mois, puis prolongation si le cancer est actif ou en cours de traitement</b>
<b>Syndrome des anticorps antiphospholipides</b>	<b>durée non limitée</b>
<b>Déficit en antithrombine, déficit en protéine C</b>	<b>plutôt durée non limitée</b>
Thrombose veineuse profonde <b>sur cathéter veineux avec cathéter retiré</b>	<b>3 mois</b> , puis si cancer actif ou en cours de traitement discuter prolongation
Thrombose veineuse profonde <b>sur cathéter veineux avec cathéter maintenu</b>	<b>tant que le cathéter est en place</b>